

DLA PACJENTÓW ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U PACJENTA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PO PODANIU PRODUKTU LECZNICZEGO W POSTACI ŚRODKA KONTRASTOWEGO

Po podaniu środka kontrastowego pacjent powinien być obserwowany **przez co najmniej 30 minut**, ponieważ większość ciężkich działań niepożądanych występuje w tym czasie. Doświadczenia wskazują, że możliwe jest również wystąpienie opóźnionych reakcji nadwrażliwości, pojawiających się do kilkunastu godzin lub dni od podania produktu leczniczego.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem środków kontrastowych są zwykle łagodne lub umiarkowane i przejściowe. Ciężkie działania niepożądane, w tym przypadki śmiertelne, obserwowano bardzo rzadko. Reakcje nadwrażliwości mogą występować w postaci objawów ze strony układu oddechowego oraz w postaci reakcji skórnych. Mogą one obejmować duszności, wysypkę, rumień, pokrzywkę, świąd, ciężkie reakcje skórne, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, gorączkę, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli lub obrzęk płuć.

UWAGA PACJENCIE:

W przypadku zaobserwowania u siebie powyższych objawów w dniu odbycia badania diagnostycznego jednak po wyjściu ze szpitala, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ lub zgłosić się na najbliższy oddział ratunkowy.