



Tytuł dokumentu:	<b>Zalecenia dla pacjentów - Leczenie przerzutów do układu kostnego (terapia przeciwbólowa).</b>		
Numer dokumentu:	ZA-128	Edycja dokumentu:	1

## **Zalecenia dla pacjentów:**

### **Leczenie przerzutów do układu kostnego (terapia przeciwbólowa).**

---

W dniu kwalifikacji do leczenia/rozpoczęcia leczenia pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C.

**(godzina przyścia do Zakładu nie jest godziną kwalifikacji do leczenia/rozpoczęcia leczenia).**

**Procedury radioizotopowe stosuje się w przebiegu:**

#### **1. Leczenie przerzutów do układu kostnego (terapia przeciwbólowa) Sm-153.**

(Cel leczenia- Leczenie radioizotopowe izotopem samaru Sm-153 chorych z przerzutami nowotworowymi do kości powodującymi objawy bólowe),

#### **2. Leczenie przerzutów do układu kostnego (terapia przeciwbólowa) Ra- 223.**

(Cel leczenia- Leczenie radioizotopowe izotopem radu Ra-223 chorych z przerzutami nowotworowymi do kości powodującymi objawy bólowe).

Kwalifikacja do leczenia przeprowadzana jest przez lekarza specjalistę z dziedziny medycyny nuklearnej na podstawie skierowania od lekarza (specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Lekarz zbiera wywiad medyczny i zapoznaje się z dostarczoną przez pacjenta dokumentacją medyczną. Na tej podstawie zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu leczenia. Ustalony zostaje termin leczenia.

#### **2. Leczenie polega na:**

Przed przystąpieniem do leczenia u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego).

Pielęgniarka w gabinecie aplikacji zakłada wkłucie dożylnie tzw. wenflon.

Bezpośrednio przed podaniem radiofarmaceutyku pacjent powinien wypić lub otrzymać dożylnie minimum 500 ml płynu.

Lekarz podaje pacjentowi dożylnie radiofarmaceutyk, a po podaniu pielęgniarka usuwa wenflon i zaopatruje miejsca wkłucia.

#### **3. Przygotowanie pacjenta:**

Przed przybyciem na leczenie pacjent zjada posiłek oraz zażywa ranną dawkę leków (możliwe są pewne wyjątki – należy postępować wg wskazówek uzyskanych w trakcie kwalifikacji do leczenia).



Tytuł dokumentu:	<b>Zalecenia dla pacjentów - Leczenie przerzutów do układu kostnego (terapia przeciwbólowa).</b>		
Numer dokumentu:	ZA-128	Edycja dokumentu:	1

#### **4. Ograniczenia:**

Brak.

#### **5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią:**

- kobiety w ciąży- przeciwwskazanie do leczenia.
- karmienie piersią- przeciwwskazanie do leczenia.

#### **6. Zdarzenia niepożądane:**

- wynaczynienie radiofarmaceutyku,
- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu.

#### **7. Po zakończonym leczeniu:**

- dniu podania radiofarmaceutyku należy wypijać większą niż zwykle ilość płynów (dokładne wskazówki podane zostały w trakcie kwalifikacji do leczenia),
- w dniu podania radiofarmaceutyku wzmożony reżym higieniczny: zmiana bielizny, kąpiel w godzinach wieczornych,
- przez okres 14 dni od podania izotopu unikanie kontaktu z kobietami w ciąży (w przypadku dużych dawek leku okres ten ulega wydłużeniu – postępowanie według wskazówek lekarza kwalifikującego do leczenia),
- do 7 dni po podaniu leku unikanie bliskiego (np. branie na kolana, usypianie) kontaktu z małymi dziećmi.
- przez 14 dni po podaniu izotopu osobne łóżko do spania,
- po 14 dniach od podania izotopu wykonanie kontrolnej morfologii i wizyta u lekarza wynikiem.

Opracował/a: Jolanta Miler-Sowińska



## Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokument:	<b>Zalecenia dla pacjentów - Leczenie przerzutów do układu kostnego (terapia przeciwbólowa).</b>		
Numer dokumentu:	ZA-128	Edycja dokumentu:	1