



|                  |                                                                                                                           |                   |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Tytuł dokumentu: | <b>Zalecenia dla pacjentów - Leczenie raka gruczołu krokowego z zastosowaniem lutetetu Lu-177- wipiwotydu-tetraksetan</b> |                   |          |
| Numer dokumentu: | <b>ZA-129</b>                                                                                                             | Edycja dokumentu: | <b>1</b> |

**Zalecenia dla pacjentów:****Leczenie raka gruczołu krokowego z zastosowaniem lutetu Lu-177-wipiwotydu-tetraksetan.**

W dniu kwalifikacji do leczenia/rozpoczęcia leczenia pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C.

**(godzina przyścia do Zakładu nie jest godziną kwalifikacji do leczenia/rozpoczęcia leczenia).**

**1. Cel leczenia:**

Leczenie raka gruczołu krokowego z zastosowaniem lutetu Lu-177-wipiwotydu-tetraksetan.

Kwalifikacja do leczenia przeprowadzana jest przez lekarza specjalistę z dziedziny medycyny nuklearnej na podstawie skierowania od lekarza (specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Lekarz zbiera wywiad medyczny i zapoznaje się z dostarczoną przez pacjenta dokumentacją medyczną. Na tej podstawie zostaje podjęta decyzja o leczeniu.

**2. Na czym polega leczenia:**

Pielęgniarka w gabinecie aplikacji zakłada wkłucie tzw. wenflon. Pacjent na rozpoczęcie leczenia oczekuje w monitorowanym pokoju oczekiwań, w którym pielęgniarka w obecności lekarza i Inspektora Ochrony Radiologicznej podaje pacjentowi drogą dożylną radiofarmaceutyk w powolnej iniekcji, trwającej około 1-10 minut. Po podaniu preparatu obserwuje chorego przez co najmniej 2 godziny.

Po zakończonym leczeniu pielęgniarka usuwa wenflon i zaopatruje miejsca wkłucia.

**3. Przygotowanie pacjenta:**

Przed podaniem leku Lu-177-wipiwotydu-tetraksetanu, należy pić duże ilości wody, aby utrzymać nawodnienie.

**4. Zdarzenia niepożądane:**

- wynaczynienie radiofarmaceutyku,
- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu.

**5. Ograniczenia:**

Brak.



## Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

|                  |                                                                                                                           |                   |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Tytuł dokumentu: | <b>Zalecenia dla pacjentów - Leczenie raka gruczołu krokowego z zastosowaniem lutetetu Lu-177- wipiwotydu-tetraksetan</b> |                   |          |
| Numer dokumentu: | <b>ZA-129</b>                                                                                                             | Edycja dokumentu: | <b>1</b> |

**6. Po zakończonym leczeniu:**

**Inspektor Ochrony Radiologicznej dokonuje pomiarów i określa, kiedy pacjent może opuścić kontrolowany obszar Zakładu.**

W pierwszych godzinach po podaniu leku, pacjent powinien jak najczęściej oddawać mocz celem zmniejszenia wpływu promieniowania jonizującego na ściany pęcherza moczowego oraz nerki.

W dniu podania leku pacjent otrzymuje kartę informacyjną wraz z informacjami o zasadach ochrony radiologicznej, konieczności izolacji (szczegółowości od kobiet w ciąży i dzieci -do ok. 2 tygodni), o konieczności stosowania antykoncepcji oraz o zachowywaniu się w domu po leczeniu, aby uniknąć skażenia:

- ograniczyć bliski kontakt (w odległości mniejszej niż 1 metr) z innymi osobami z tego samego gospodarstwa domowego przez 2 dni, a z dziećmi i kobietami w ciąży przez 7 dni,
- powstrzymać się od współżycia seksualnego przez 7 dni,
- spać w oddzielnej sypialni niż inne osoby z tego samego gospodarstwa domowego przez 3 dni; pacjenci nie powinni spać w tej samej sypialni z dziećmi przez 7 dni, a z kobietami w ciąży przez 15 dni,
- w przypadku pacjentów, którzy mają partnerów w wieku rozrodczym: partner i/lub pacjentka muszą stosować metodę antykoncepcji z odpowiednią barierą ochronną, uznaną za akceptowalną w trakcie leczenia i przez 14 tygodni po ostatnim podaniu dawki leku.

Opracował/a: Jolanta Miler-Sowińska



## Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

|                  |                                                                                                                           |                   |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Tytuł dokument:  | <b>Zalecenia dla pacjentów - Leczenie raka gruczołu krokowego z zastosowaniem lutatetu Lu-177- wipiwotydu-tetraksetan</b> |                   |          |
| Numer dokumentu: | <b>ZA-129</b>                                                                                                             | Edycja dokumentu: | <b>1</b> |