



Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Radioizotopowe badanie funkcji mięśnia sercowego techniką pierwszego przejścia.		
Numer dokumentu:	ZA-131	Edycja dokumentu:	1

Zalecenia dla pacjentów:

Radioizotopowe badanie funkcji mięśnia sercowego techniką pierwszego przejścia.

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C
(godzina przyścia do Zakładu nie jest godziną badania).

1. Cel badania:

Ocena czynności serca.

2. Na czym polega badanie:

Przed przystąpieniem do badania u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego).

Pielęgniarka w gabinecie aplikacji zakłada wkłucie do żyły tzw. wenflon. Elektroradiolog układa pacjenta w pozycji na wznak z rękoma ułożonymi nad głową. Pielęgniarka podłącza do wenflonu strzykawkę z radiofarmaceutyką. Badanie wykonuje elektroradiolog, podczas którego lekarz podaje pacjentowi dożylnie radiofarmaceutyk. Badanie jest bezbolesne i trwa z ułożeniem ok. 10 min.

Po zakończonym badaniu pielęgniarka usuwa wenflon i zaopatruje miejsca wkłucia.

3. Przygotowanie pacjenta do badania:

- wymagane jest pozostanie na czczo.

4. Kobiety w ciąży i karmiące piersią:

- kobiety w ciąży- wykonanie badania tylko uznane za konieczne (ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badania. Badanie radioizotopowe można wykonać tylko u tych kobiet w ciąży, u których spodziewane korzyści z wykonania badania przewyższają ryzyko dla płodu),

- kobiety karmiące- proszone są o poinformowanie personelu medycznego w celu uzyskania szczegółowych zaleceń uwzględniających planowaną dawkę radiofarmaceutyku oraz sytuację pacjenta.

5. Ograniczenia:

Waga pacjenta do 190 kg.

6. Zdarzenia niepożądane:

- wynaczynienie radiofarmaceutyku,
- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu.



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Radioizotopowe badanie funkcji mięśnia sercowego techniką pierwszego przejścia.		
Numer dokumentu:	ZA-131	Edycja dokumentu:	1

7. Po badaniu:

- kobiety w ciąży- po zakończonym badaniu pacjentka powinna pić duże ilości płynów oraz często oddawać mocz, aby zmniejszyć narażenie płodu na promieniowanie jonizujące,
- karmienie piersią- stosować się do indywidualnych zaleceń,
- w dniu badania osobami towarzyszącymi nie mogą być kobiety w ciąży i dzieci (do 16 r.ż.),
- w dniu badania należy unikać bezpośredniego kontaktu z w/w osobami.

8. Kiedy wynik badania będzie gotowy:

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta pacjent.gov.pl – w ciągu kilku dni (zgodnie z ustaleniami pracowni).

Opracował/a: Jolanta Miler-Sowińska