

PRZYGOTOWANIE DO MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ

MAMMOGRAFIA SPEKTRALNA (CEM)

polega na wykonaniu zdjęć jak podczas zwykłej mammografii, po uprzednim podaniu jodowego środka kontrastowego. Badanie trwa 10-15 minut.

- wieczorem przed badaniem należy wypić około litra wody niegazowanej
- szczegółowo zapoznać się ze skierowaniem i dokładnie wypełnić ankietę
- należy zażyć leki, które są przyjmowane na stałe
- pacjenci z cukrzycą powinni zażyć leki i zjeść lekki posiłek
- należy zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań (USG, mammografię, MR, opisy ze zdjęciami, płyty CD)
- konieczne jest posiadanie wyniku poziomu kreatyniny (badanie ważne 3 miesiące)
- u pacjentek u których zdiagnozowano nadczynność tarczycy lub mają nieprawidłowe poziomy hormonów tarczycy, konieczne jest posiadanie poziomu TSH (wynik ważny 3 miesiące) lub zgodę endokrynologa na podanie środka kontrastowego
- przy nieregularnych miesiączkach konieczne jest posiadanie wyniku poziomu progesteronu (ważny 48 godz.)
- u kobiet miesiączkujących regularnie mammografia spektralna wykonywana jest między 6 a 15 dniem cyklu miesiączkowego

