



Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia przytarczyc – badanie dwufazowe		
Numer dokumentu:	ZA-120	Edycja dokumentu:	2

Zalecenia dla pacjentów

Scyntygrafia przytarczyc – badanie dwufazowe

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C (godzina przyścia do Zakładu nie jest godziną badania).

Czas pobytu na badaniu ok 4 godz.

1. Cel badania

Zobrazowanie nieprawidłowości w obrębie gruczołu przytarczyc.

2. Na czym polega badanie

Kwalifikacja na badanie przeprowadzana jest na podstawie skierowania wydanego przez lekarza.

Pielęgniarka podaje pacjentowi drogą dożylną radiofarmaceutyk. W badaniu dwufazowym wykonuje się dwa zestawy obrazowania w różnych odstępach czasu. Technika SPECT/SPECT-CT pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz położenia przytarczyc. Badanie jest bezbolesne i trwa ok 3-4 h.

Czas rozpoczęcia akwizycji: 15–20 minut po podaniu radiofarmaceutyku,
2-3 h po podaniu – obraz opóźniony,
- pozycja pacjenta - leżąca na wznak,
- zakres obrazowania - okolica szyi i śródpiersia,

3. Jak się przygotować

- Nie ma konieczności specjalnego przygotowania.
- Zdjąć biżuterię i metalowe przedmioty z okolicy klatki piersiowej i szyi.

Przeciwwskazania medyczne do zastosowania procedury: Stwierdzona nadwrażliwość na preparat. Poza tym brak przeciwwskazań medycznych, poza ograniczeniami wynikającymi z konieczności spełnienia wymogów związanych z ochroną pacjenta przed promieniowaniem jonizującym. Waga powyżej 190kg.

4. Kobiety w ciąży i karmiące piersią

- Badanie u kobiet w ciąży wykonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach.
- Kobiety karmiące piersią mogą zwykle kontynuować karmienie, ale w tym przypadku nie należy podawać dziecku pierwszej porcji pokarmu po zakończeniu procedury. Przed przystąpieniem do badania u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego)



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia przytarczyc – badanie dwufazowe		
Numer dokumentu:	ZA-120	Edycja dokumentu:	2

5. Zdarzenia niepożądane

- wynaczynienie radiofarmaceutyku ,
- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu,

6. Po badaniu

- Można wrócić do codziennych czynności.
- Zaleca się picie większej ilości płynów i częstsze oddawanie moczu.
- W dniu badania osobami towarzyszącymi nie mogą być kobiety w ciąży i dzieci (do 16 r.ż.).
- Należy unikać bliskiego kontaktu z w/w osobami w dniu badania.

Pacjent nie wymaga specjalnego postępowania lekarskiego ani pielęgnarskiego po przeprowadzeniu powyższej procedury radiologicznej.

7. Kiedy wynik badania będzie gotowy

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta **pacjent.gov.pl** –zgodnie z ustaleniami pracowni.

Opracował/a: V. Pankowska