



Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia lokalizacja węzła wartowniczego		
Numer dokumentu:	ZA-132	Edycja dokumentu:	2

Zalecenia dla pacjentów:**Scyntygrafia lokalizacji węzła wartowniczego.**

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C
(godzina przyścia do Zakładu nie jest godziną badania) – dotyczy pacjentów ambulatoryjnych.

W dniu badania pacjentom z oddziałów towarzyszy sanitariusz (w drodze na i po badaniu).

1. Cel badania:

Diagnostyczne poszukiwanie węzłów wartowniczych oraz zobrazowanie kierunków spływu chłonki.

2. Na czym polega badanie:

Przed przystąpieniem do leczenia u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego).

Lekarz na skórze pacjenta zaznacza miejsca podania radiofarmaceutyku.

Pielęgniarka w gabinecie aplikacji podaje drogą śródskórną izotop. Zakłada opatrunek.

Pacjent po podaniu leku „ćwicz” ok. 1 godz. wg. instruktażu podanego przez pielęgniarkę (zakres ćwiczeń zależy od miejsca podania radiofarmaceutyku).

Badanie scyntygraficzne wykonuje elektroradiolog. Układa pacjenta w pozycji leżącej na wznak z rękoma ułożonymi nad głową. Gammakamera rejestruje kierunek spływu chłonki (w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość wykonania SPECT-CT), co rysunkiem na skórze zaznacza elektroradiolog.

3. Jaki się przygotować:

Pacjent nie wymaga przygotowania do badania.

4. Ograniczenia:

Waga pacjenta do 190 kg.

5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią:

- kobiety w ciąży- wykonanie badania tylko uznane za konieczne (ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badania. Badanie radioizotopowe można wykonać tylko u tych kobiet w ciąży, u których spodziewane korzyści z wykonania badania przewyższają ryzyko dla płodu),

- kobiety karmiące- proszone są o poinformowaniu personelu medycznego w celu uzyskania szczegółowych zaleceń uwzględniających planowaną dawkę radiofarmaceutyku oraz sytuację pacjenta.



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia lokalizacja węzła wartowniczego		
Numer dokumentu:	ZA-132	Edycja dokumentu:	2

6. Zdarzenia niepożądane:

Martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu.

7. Po badaniu:

- kobiety w ciąży- po zakończonym badaniu pacjentka powinna pić duże ilości płynów oraz często oddawać mocz, aby zmniejszyć narażenie płodu na promieniowanie jonizujące,
- karmienie piersią- stosować się do indywidualnych zaleceń,
- pacjent nie wymaga specjalnego postępowania.

8. Kiedy wynik badania będzie gotowy

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta pacjent.gov.pl – zgodnie z ustaleniami pracowni.

Opracował/a: Jolanta Miler-Sowińska