



Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia perfuzyjna płuc.		
Numer dokumentu:	ZA-135	Edycja dokumentu:	2

Zalecenia dla pacjentów:**Scyntygrafia perfuzyjna płuc.**

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C

(godzina przyścia do Zakładu nie jest godziną badania).

1. Cel badania:

Ocena perfuzji płuc.

2. Na czym polega badanie:

Przed przystąpieniem do leczenia u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego).

Pielęgniarka w gabinecie aplikacji zakłada wkłucie do żyły tzw. wenflon.

Badanie scyntygraficzne wykonuje elektroradiolog, który czuwa nad Państwem bezpieczeństwem (obserwuje i słyszy Was). Układa pacjenta w pozycji leżącej na wznak z rękoma ułożonym nad głową. W trakcie badania pielęgniarka podaje przez wkłucie radiofarmaceutyk. Badanie jest bezbolesne i trwa ok. 15 min.

Po zakończonym badaniu pielęgniarka usuwa wenflon i zaopatruje miejsca wkłucia.

3. Jak się przygotować:

- nie jest wymagane pozostanie na czczo.

4. Kobiety w ciąży i karmiące piersią:

- kobiety w ciąży- badania tylko uznane za konieczne, (ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badania. Badanie radioizotopowe można wykonać tylko u tych kobiet w ciąży, u których spodziewane korzyści z wykonania badania przewyższają ryzyko dla płodu).

- kobiety karmiące piersią- proszone są o poinformowaniu personelu medycznego w celu uzyskania szczegółowych zaleceń uwzględniających planowaną dawkę radiofarmaceutyku oraz sytuację pacjenta.

5. Ograniczenia:

Waga pacjenta do 190 kg.

6. Zdarzenia niepożądane:

- wynaczynienie radiofarmaceutyku,



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia perfuzyjna płuc.		
Numer dokumentu:	ZA-135	Edycja dokumentu:	2

- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu.

7. Po badaniu:

- kobiety w ciąży powinny pić duże ilości płynów oraz często oddawać mocz, aby zmniejszyć narażenie płodu na promieniowanie jonizujące,
- kobiety karmiące piersią- stosować się do indywidualnych zaleceń,
- pacjent nie wymaga specjalnego postępowania po badaniu,
- osobami towarzyszącymi nie mogą być kobiety w ciąży i dzieci (do 16 r.ż),
- w dniu badania należy unikać bezpośredniego kontaktu z w/w osobami.

8. Kiedy wynik badania będzie gotowy:

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta pacjent.gov.pl – zgodnie z ustaleniami pracowni.

Opracował/a: Jolanta Miler-Sowińska