



Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia uchyłka Meckela		
Numer dokumentu:	ZA-137	Edycja dokumentu:	2

Zalecenia dla pacjentów:**Scyntygrafia uchyłka Meckela.**

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C

(godzina przyścia do Zakładu nie jest godziną badania).

1. Cel badania:

Diagnostyczny: wykrycie i lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka w obrębie uchyłka Meckela oraz innych anomalii rozwojowych przewodu pokarmowego.

2. Badanie polega na:

Przed przystąpieniem do badania u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego).

Pielęgniarka w gabinecie aplikacji zakłada wkłucie do żyły tzw. wenflon, przez który podaje radiofarmaceutyk. Badanie scyntygraficzne wykonuje elektoradiolog, który czuwa nad Państwa bezpieczeństwem (obserwuje i słyszy Was). Układa pacjenta w pozycji leżącej na wznak z rękoma ułożonym nad głową. Badanie jest bezbolesne i trwa 30 min. Przerwa ok. 1 godz. (pacjent oczekuje w poczekalni) i ponowne badanie. Czas badania 10 min. W zależności od uzyskiwanych wyników lekarz może zdecydować o konieczności kontynuacji lub zakończenia badania.

3. Przygotowanie pacjenta:

- wymagane jest pozostanie na czczo.

4. Ograniczenia:

Waga pacjenta do 190 kg.

5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią:

- kobiety w ciąży- badania tylko uznane za konieczne, (ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badania. Badanie radioizotopowe można wykonać tylko u tych kobiet w ciąży, u których spodziewane korzyści z wykonania badania przewyższają ryzyko dla płodu).

- kobiety karmiące piersią- proszone są o poinformowaniu personelu medycznego w celu uzyskania szczegółowych zaleceń uwzględniających planowaną dawkę radiofarmaceutyku oraz sytuację pacjenta.

6. Zdarzenia niepożądane:

- wynaczynienie radiofarmaceutyku,
- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu.



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Scyntygrafia uchyłka Meckela		
Numer dokumentu:	ZA-137	Edycja dokumentu:	2

7. Po zakończonym badaniu:

- kobiety w ciąży- po zakończonym badaniu pacjentka powinna pić duże ilości płynów oraz często oddawać mocz, aby zmniejszyć narażenie płodu na promieniowanie jonizujące,
- kobiety karmiące piersią – stosowanie się do indywidualnych zaleceń,
- pacjent nie wymaga specjalnego postępowania po badaniu,
- osobami towarzyszącymi nie mogą być kobiety w ciąży i dzieci (do 16 r.ż),
- w dniu badania należy unikać bezpośredniego kontaktu z w/w osobami.

8. Kiedy wynik badania będzie gotowy

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta pacjent.gov.pl – zgodnie z ustaleniami pracowni.

Opracował/a: Jolanta Miler-Sowińska