



Tytuł dokument:	Zalecenia dla pacjentów - Limfoscintygrafia		
Numer dokumentu:	ZA-140	Edycja dokumentu:	2

Zalecenia dla pacjentów:**Limfoscintygrafia.**

W dniu badania pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej - budynek C

(godzina przyjścia do Zakładu nie jest godziną badania).

1. Cel badania:

Ocena drenażu i lokalizacji struktur układu limfatycznego

2. Badanie polega na:

Przed przystąpieniem do badania u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ciążę (podpisanie przez kobietę odpowiedniego oświadczenia, w razie potrzeby - wykonanie testu ciążowego).

Elektrodiagnostyk układa pacjenta na stole aparatu. Pielęgniarka w zależności od badanego obszaru ciała podaje śródskórną radiofarmację (kończyna górna- między drugim i trzecim palcem na grzbiecie dłoni, kończyna dolna- między pierwszym i drugim palcem na grzbiecie stopy). Badanie trwa 10-20 min.

Przerwa ok. 1 godz. (pacjent oczekuje w poczekalni i „ćwiczy” wg. instruktażu podanego przez pielęgniarkę (zakres ćwiczeń zależy od miejsca podania radiofarmacji) i ponowne badanie. Czas badania 10-20 min. W zależności od uzyskiwanych wyników lekarz może zdecydować o konieczności kontynuacji lub zakończenia badania.

3. Przygotowanie pacjenta:

- nie jest wymagane pozostanie na czczo.

4. Kobiety w ciąży i karmiące piersią:

- kobiety w ciąży- badania tylko uznane za konieczne, (ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badania. Badanie radioizotopowe można wykonać tylko u tych kobiet w ciąży, u których spodziewane korzyści z wykonania badania przewyższają ryzyko dla płodu),

- kobiety karmiące piersią- proszone są o poinformowaniu personelu medycznego w celu uzyskania szczegółowych zaleceń uwzględniających planowaną dawkę radiofarmacji oraz sytuację pacjenta.

5. Ograniczenia:

Waga pacjenta do 190 kg.



Katalog zaleceń dla pacjentów Centrum Onkologii

Tytuł dokumentu:	Zalecenia dla pacjentów - Limfoscyntygrafia		
Numer dokumentu:	ZA-140	Edycja dokumentu:	2

6. Zdarzenia niepożądane:

- martwica, owrzodzenie w miejscu podania izotopu.

7. Po zakończonym badaniu:

- kobiety w ciąży- po zakończonym badaniu pacjentka powinna pić duże ilości płynów oraz często oddawać mocz, aby zmniejszyć narażenie płodu na promieniowanie jonizujące,
- kobiety karmiące piersią – stosowanie się do indywidualnych zaleceń,
- pacjent nie wymaga specjalnego postępowania po badaniu,
- osobami towarzyszącymi nie mogą być kobiety w ciąży i dzieci (do 16 r.ż),
- w dniu badania należy unikać bezpośredniego kontaktu z w/w osobami.

8. Kiedy wynik badania będzie gotowy

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną lub dostępny jest na koncie pacjenta pacjent.gov.pl – zgodnie z ustaleniami pracowni.

Opracował/a: Jolanta Miler-Sowińska